Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 03:28

Link do produktu: https://www.sklepszczelarski.com.pl/ecocid-s-wirusobojczy-do-dezynfekcji-i-odkazania-na-5-l-roztworu-do-dezynfekcji-p-728.html



Ecocid S wirusobójczy do dezynfekcji i odkażania - na 5 l roztworu do dezynfekcji

Cena brutto	**9,00 zł**
Cena netto	**8,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Ecocid S 50g

Proszek rozpuszczalny w wodzie przeznaczony do dezynfekcji.
• Preparat biobójczy do stosowania w medycynie weterynaryjnej
• Preparat do dezynfekcji systemów wody pitnej przeznaczonych dla zwierząt
• Preparat dezynfekcyjny do stosowania w przemyśle spożywczym i paszowym
Ecocid® S jest preparatem dezynfekcyjnym wykazującym aktywność przeciwko wirusom.
Posiada również właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze w stosunku do Candida albicans.
Dzięki szerokiemu spektrum działania biobójczego preparat może być używany w:
medycynie weterynaryjnej: (gabinety, kliniki, laboratoria weterynaryjne) do dezynfekcji powierzchni, wyposażenia, pojemników, naczyń szklanych, instrumentów itp.,
hodowli zwierząt: do dezynfekcji wszelkich powierzchni i wyposażenia używanego do przygotowywania karmy, jak również w stajniach, oborach, schroniskach dla psów, wszelkich klatkach dla zwierząt, ulach, lub w innych pomieszczeniach gdzie trzymane są zwierzęta,
inne miejsca zastosowania: do dezynfekcji środków transportu dla zwierząt, powierzchni i sprzętu na targach zwierząt, rzeźni, miejsc obróbki i przechowywania żywności oraz do dezynfekcji sprzętu i powierzchni w gospodarstwie domowym.
Ecocid® S jako roztwór aktywny jest stosowany w postaci aerozolu, rozpylania, zamgławiania lub kąpieli np. kopyt, a także do stosowania na wszelkich barierach dezynfekcyjnych – np. maty. Do ogólnej dezynfekcji uprzednio oczyszczonej powierzchni i wyposażenia należy przygotować 1 % roztwór Ecocid® S. W tym celu należy rozpuścić zawartość 50 g opakowania w 5 litrach wody. Polecane jest użycie letniej wody w celu szybszego rozmieszania preparatu. Gdy potrzebna jest większa objętość roztworu polecamy użyć opakowania 1 kg, które należy rozpuścić w 100l wody.
Sposób użycia
Roztwór
Instrukcja stosowania
Dezynfekcja zasadnicza
1 : 100
(1%)
Przygotowany roztwór rozpylić na uprzednio oczyszczoną, przeznaczoną do dezynfekcji powierzchnię za pomocą niskociśnieniowych lub innych mechanicznych spryskiwaczy w dawce 300 ml/m2.
Po 30 do 60 minut lub po wyschnięciu powierzchni wprowadzić zwierzęta.
Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń
Na fermach, w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt lub do przygotowania karmy
1 : 200 – 1 : 33
(0,5% do 3%)
zależnie od stopnia zabrudzenia
Powierzchnię urządzeń czyścić i dezynfekować nanosząc roztwór roboczy poprzez rozpylenie go niskociśnieniowym lub innym mechanicznym spryskiwaczem w dawce 300ml/m2.
Po 15-60 minutach, zależnie od poziomu zabrudzenia spłukać czystą wodą.
Czyszczenie systemu wody pitnej
Dezynfekcja i czyszczenie zasadnicze
1: 200
(0,5%)
Należy napełnić zbiornik wodą i dodać roztwór roboczy preparatu. Po 60 minutach cały system dokładnie przepłukać czystą

wodą.
Kontynuacja czyszczenia systemu wody pitnej
1 : 1000
(0,1%)
Wymieszać właściwą ilość preparatu Ecocid® S z wodą znajdującą się w zbiorniku lub przygotować roztwór roboczy i przepuścić przez cały system używając urządzenia automatycznie dozującego.
Dezynfekcja przez maty dezynfekcyjne dla samochodów lub do butów, oraz przez kąpiele kopyt
1 : 100
(1%)
Stosować nasączone maty dezynfekcyjne lub płyn w wannach do dezynfekcji kopyt przez 4 dni lub do czasu zbytniego zabrudzenia roztworu.
Dezynfekcja metodą rozpylania
Rozpylanie preparatu w celu zredukowania przenoszenia się infekcji w okresie wybuchu choroby (szczególnie układu oddechowego)
Zamgławianie na zimno
Zamgławianie na gorąco
1 : 200
(0,5%)
1 : 100
(1%)
1 : 25
(4%)
Dezynfekować poprzez rozpylanie za pomocą spryskiwaczy ciśnieniowych lub innych spryskiwaczy przenośnych w dawce 1 l/10m2 powierzchni podłogi.
Zamgławiać puste pomieszczenia za pomocą zamgławiacza w dawce 1 l/10m2 powierzchni podłogi i pozostawić by mgła działała przez 30 min.
Przed wprowadzeniem zwierząt należy przeprowadzić wentylację pomieszczeń przez 30 do 60 minut.
Najpierw zmieszać 15 części nośnika - „zawieszacza mgły” z 85 częściami wody. Następnie do powstałego roztworu dodać preparat Ecocid® S.
Tak powstałym roztworem roboczym zamgławiać używając specjalnego zamgławiacza, w dawce 1 l/40m2 powierzchni podłogi i pozostawić by mgła działała przez 30 do 60 min.
Przed wprowadzeniem zwierząt należy przeprowadzić wentylację pomieszczeń przez 30 do 60 minut.
Działania niepożądane i pierwsza pomoc
Jeżeli wdychanie preparatu spowoduje podrażnienie układu oddechowego, poszkodowanego należy natychmiast wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku wystąpienia trudności z oddychaniem, rzężeń, napadów kaszlu i gdy problemy te są uciążliwe, a powrót do zdrowia nie następuje szybko, natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku podrażnienia skóry zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież i spłukać skórę bardzo dużą ilości wody. Gdy podrażnienia występują mimo przepłukania wodą, zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku podrażnienia oczu - natychmiast płukać spojówkę oka bardzo dużą ilością czystej wody lub roztworu soli fizjologicznej starając się jak najbardziej wywinąć powieki. Zabieg wykonywać przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza okulisty.
W przypadku podrażnienia ust, gardła, żołądka, błony śluzowej przewodu pokarmowego nie wywoływać wymiotów. Spłukać jamę ustną dużą ilością wody. Jeżeli poszkodowany jest przytomny powinien wypić dużą ilość wody. Bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza udostępniając etykietę preparatu.
Postępowanie z pozostałościami preparatu i opakowań.
Opakowania lub pojemniki należy usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi.
Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
Środki bezpieczeństwa i inne instrukcje.
Należy używać ochronnej odzieży, obuwia, okularów, masek i rękawic.
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w temperaturze poniżej 30° C. Chronić przed wilgocią.
Przechowywać z dala od źródeł ognia lub materiałów łatwopalnych.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Zaleca się całkowite wykorzystanie zawartości preparatu Ecocid® S po otwarciu opakowania.
Sprzęt wykorzystywany do dezynfekcji należy wypłukać dużą ilością wody.
Podmiot odpowiedzialny:
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia
Tel.: +386 7 331 20 72
Fax.: +386 7 332 26 31
E-mail: MSDS@krka.biz

- Preparat biobójczy do stosowania w medycynie weterynaryjnej
- Preparat do dezynfekcji systemów wody pitnej przeznaczonych dla zwierząt
- Preparat dezynfekcyjny do stosowania w przemyśle spożywczym i paszowym

ECOCID S to preparat do dezynfekcji sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w hodowli i produkcji spożywczej

ECOCID S jest uniwersalnym i wysoce efektywnym preparatem dezynfekcyjnym, zapewniającym ochronę przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi, w tym przed PTASIĄ GRYPĄ wywoływaną przez wirusa H5N1, świńską grypą i chorobami wirusowymi.

ECOCID S wykazuje się szerokim spektrum aktywności wirusobójczej, bakteriobójczej oraz grzybobójczej.

ECOCID S łatwy do użycia na każdej powierzchni i wyposażeniu we wszelkich pomieszczeniach.

ECOCID S jest przyjazny dla środowiska oraz bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Zgodny z zasadami HCCP.

DEZYNFEKCJĘ ZALECA SIĘ PRZEPROWADZAĆ:

- w okresie zagrożenia infekcjami, w czasie trwania choroby i po jej wygaśnięciu
- Ecocid S jest efektywny również w niskich temperaturach, w twardej wodzie oraz w obecności zanieczyszczeń organicznych
- stosowany zgodnie z zaleceniami nie powoduje korozji
- posiada świeży, cytrynowy zapach

SKŁAD: mononadsiarczan potasu - substancja czynna preparatu. Efektywność wzmocniona przez dodatek czynników powierzchniowo-czynnych, kwasów organicznych oraz nieorganicznego systemu buforującego.

Ecocid S jako roztwór aktywny stosowany jest w postaci aerozolu, rozpylania oraz zamgławiania.

DO OGÓLNEJ DEZYNFEKCJI: 50 g rozpuścić w 5 litrach wody, zalecane jest używanie gumowych rękawic.

OPAKOWANIE 50 G

Produkt posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3025/06 na obrót produktem biobójczym.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności.